



## KLAMYDIA

### Informasjon om behandling med azitromycin

Antibiotika gis til alle som har fått påvist klamydiabakterien ved testing. Det gis også til nåværende og/eller tidligere fast partner, som antas å være smittet.

#### BEHANDLING

Azitromycin 500 mg (2 tabletter)

Ta begge tablettene samtidig og med rikelig drikke, helst vann. Skal tas utenom andre medisiner. For å forebygge kvalme eller oppkast, kan det hjelpe å ta tablettene etter et måltid. Du kan også forsøke å ta tablettene om kvelden, rett før du legger deg.

#### VANLIGSTE BIVIRKNINGER

Diaré, magesmerter, kvalme, luft i magen.

Skulle du kaste opp innen to timer etter at du har tatt tablettene, kan det være den ikke har effekt. Ring eller chat med oss hvis du er usikker om du trenger flere tabletter.

#### SEX

Det anbefales pause fra seksuell kontakt (heller ikke med kondom) i 7 dager fra og med den dagen du starter med behandlingen. Dette for å unngå nysmitte og fordi underlivet trenger ro.

#### KONTROLL

Det er ikke anbefalt kontrollprøve. Hvis du tar en prøve de første 4 ukene etter behandlingen, kan prøven bli positiv selv om du er ferdig behandlet. Det er fordi døde bakterier kan bli liggende en stund etter behandlingen og gjøre testen positiv.

#### BESKJED TIL PARTNER

Det er viktig at alle partnere som kan ha smittet deg eller som du kan ha smittet med klamydia, får beskjed.

Husk at kondom beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner som klamydia.